

Ratolí®

CEBO FRESCO

DESCRIPCIÓN

Es un potente raticida anticoagulante, inhibidor de la vitamina K, es efectivo frente a todas las especies de roedores debido a su formulación a base de harinas vegetales, grasas y aceites, enriquecidas con atrayentes especiales y sustancias de gran palatabilidad y apariencia. La ingestión del producto provoca la muerte del roedor de 4 a 6 días después de la ingestión por hemorragia interna, sin despertar la desconfianza de sus semejantes hacia el producto. La ingestión por una sola vez es suficiente para causar la muerte del roedor.

COMPOSICIÓN

Bromadiolona.....	0.005%
Benzoato de Denatonium.....	0.003%
Sustancias apetecibles C.S.P.....	100%

Bromadiolona: La bromadiolona es un anticoagulante de la familia de las cumarinas de elevada persistencia que se metaboliza en el hígado, se acumula en el mismo hasta alcanzar concentraciones capaces de afectar a la reutilización de la vitamina K necesaria para la formación de factores de coagulación II, VII, IX y X. Son de baja solubilidad, su estabilidad no se ve afectada a temperaturas ambientes, su absorción se realiza por vía digestiva el 90%...


INDICACIONES

Está indicado para el control, de roedores en instalaciones pecuarias de todo tipo, seguro para uso en otras clases de establecimientos por su dosis y componentes. Colocar los cebos en recipientes

especiales que faciliten el acceso de los roedores y dificulten el de otras especies de animales especialmente los domésticos.

Estas estaciones o porta cebos, protegen el cebo del polvo, la humedad, estimulan a los roedores a sentir curiosidad, reducen el riesgo de contaminación y el posible acceso a niños y animales de compañía, además permiten una fácil inspección.

BENEFICIOS



Para mayor información acerca del producto remítase a la hoja de seguridad del producto ó contacte al representante de ventas Basic Farm.

Línea Control de Roedores

Basic Farm®
Innovamos para su Beneficio

Ratolí®

CEBO FRESCO

RECOMENDACIONES

1

Cebos para ratones: se deben colocar entre la madriguera y la fuente de alimento, en las esquinas oscuras, bajo enseres, las cajas porta cebos o estaciones deben ser del tamaño adecuado, se deben colocar a una distancia de 2 a 4 metros aproximadamente, los que no se evidencie que sean visitados se aconseja cambiarlos de sitio. Los cebos deben sustituirse con frecuencia ya que los deteriorados no son apetecidos por los ratones. Se debe evitar el contacto directo con el cebo, además de ser razones de seguridad, el olor humano ahuyenta a los roedores disminuyendo su efectividad.

2

Cebos para ratas: se recomienda colocarlos con una separación de 4,5 a 15 metros dependiendo de la infestación, como en el caso de los cebos para ratones, es recomendable colocarlos entre la madriguera y la fuente de alimento, las estaciones deben ser del tamaño adecuado, no se deben mover del sitio donde se colocan, eliminar las fuentes de alimento que haya en las proximidades, tener en cuenta que un animal consume aproximadamente 30 g de alimento en una noche.

3

Cebos para rata de los tejados: se manejan en forma similar a los cebos para ratas, aparte de ser colocados sobre el suelo también se colocan en árboles, postes, cercas, techos y otras partes elevadas ya que bajan muy poco al suelo, deben atarse firmemente, hay que tener en cuenta que esta especie demuestra mayor desconfianza hacia las cosas nuevas en su entorno. Se debe evitar el contacto directo con el cebo, además de ser por razones de seguridad, el olor a humano los ahuyenta.



Registro ICA 9678-MV

PRESENTACIONES

Bolsa por 250 gramos.

Línea Control de Roedores